

CONDOR DELLE ANDE

Vultur gryphus



PESO: maschio 11 - 15 kg femmina 8 - 11 kg

APERTURA ALARE: 270 - 340 cm

ZONA DI DIFFUSIONE: Sud America, dal Venezuela e Colombia, fino alla terra del fuoco.

HABITAT: Vive e nidifica su alte montagne rocciose con canyon che
possono andare dai 1800 ai 5200 m.

ABITUDINI: Il condor delle Ande è stanziale, il suo volo è lento imponente
e maestoso. Il condor nel periodo riproduttivo emette richiami
sessuali.

ALIMENTAZIONE: Si nutre principalmente di carogne e di bestiame, che spesso
trovano la morte, nell'impermeabile ambiente Andino. La ricerca di
cibo porta il condor delle Ande anche sulle coste, dove può
trovare qualche carogna di mammifero marino oppure solo può
procacciare le uova di piccoli uccellini marini.

PERIODO DI
NIDIFICAZIONE: La deposizione delle uova avviene tra febbraio - giugno in Perù,
tra settembre - ottobre in Cile. Depone 1 solo uovo che cova per
54 - 58 giorni.

PARTICOLARITÀ: Il condor delle Ande è uno fra uccelli più grandi del mondo.
Purtroppo in passato sono stati ingiustamente perseguitati per
ignoranza e falsi giudizi sul loro ruolo. Oggi la loro importanza
ecologica è finalmente riconosciuta. Infatti, il loro comportamento
da spazzini, permette alle sostanze contenute negli animali morti,
di essere posti nuovamente in circolo.

ANDEN-KONDOR

Männchen 11 - 15 kg Weibchen 8 - 11 kg

270 - 340 cm

Südamerika, von Venezuela und Kolumbien bis nach Feuerland.

Lebt und baut sein Nest in Bergfelsen mit Schluchten, auf einer Höhe von 1800 bis 5200 m ü.M.

Der Anden-Kondor lebt immer am gleichen Platz. Sein Flug ist langsam, beeindruckend und anmutig.
Man hört ihn nicht, ausser in der Balzzeit, wo seine Balzrufe ertönen.

Er ernährt sich hauptsächlich von Aas, das in den schwierigen Lebensbedingungen der Anden häufig vorkommt. Auf Nahrungssuche fliegt er bis an die Küsten der Anden, wo er auch tote Meeressäugetiere findet oder auch Eier von Meeresvögeln raubt.

Die Brutzeit geht von Februar bis Juni in Peru, von September bis Oktober in Chile. Es wird nur 1 Ei gelegt und in 54 - 58 Tagen ausgebrütet.

Der Anden-Kondor ist einer der größten Vögel der Welt. Er wurde beinahe ausgerottet, da seine Lebensweise falsch beurteilt wurde. Heute ist seine weittragende Bedeutung für das Ökosystem anerkannt, da der Kondor, als "Strassen-Reiniger" die Substanzen der toten Tiere wieder in den Kreislauf der Natur bringt.

CONDOR DES ANDES

Mâle 11 - 15 kg femelle 8 - 11 kg

270 - 340 cm

Le condor des Andes est répandu sur toute la longueur des Andes, au nord de la Colombie, au sud de la Terre de Feu et à l'est, le long de la côte atlantique de l'Argentine jusqu'à l'embouchure du Rio Negro.

Dans les Andes, l'oiseau vit à une altitude de 3'000m à 5'000m, mais le long des côtes de l'Atlantique et du sud Pacifique, il niche également dans les hautes falaises surplombant la mer.

Le condor des Andes n'est pas un oiseau migrateur, son vol est lent, imposant et majestueux. Le condor est silencieux sauf durant la période de reproduction pendant laquelle il émet ses appels sexuels.

Le Condor des Andes est principalement un charognard et un nécrophage. Pour se nourrir de petits mammifères marins morts et d'œufs d'oiseaux marins le condor peut se déplacer des Andes jusqu'aux côtes.

1 seul œuf est déposé et couvé de 54 à 58 jours, en février-juin au Pérou, septembre-octobre au Chili.

Le condor des Andes est parmi l'un des plus grands oiseaux du monde. Par le passé ces oiseaux ont été injustement persécutés, affligés par leur mauvaise réputation et une méconnaissance de leur rôle écologique. Aujourd'hui on leur reconnaît leur rôle de nettoyeurs.

ANDEAN CONDOR

Male 11 - 15 kg Female 8 - 11 kg

270 - 340 cm

South America, from Venezuela and Colombia down to the Tierra del Fuego, along the Andes.

It lives and nests on the rocky mountains with canyons, at a height between 1800 and 5200 m.

The Andean Condor's flight is slow and majestically imposing, flapping its wings very rarely, relying on thermals to stay aloft. The condor is very silent with exception of the reproduction period during which loud calls are used to attract a partner.

Main nourishments are carrion and livestock, which usually get killed by the demanding Andean surroundings. The search for food can bring condors closer to the coastline, where beached carcasses of marine mammals can be found. They will also raid the nests of smaller birds to feed on the eggs.

Egg is laid between February and June in Peru, between September and October in Chile.
Only one egg is laid and incubated for 54 - 58 days.

The Andean Condor is amongst the largest birds in the world. Unfortunately in the past they have been wrongly persecuted by ignorance and false judgement of their role. Nowadays their importance in the ecosystem is finally recognised. Their behaviour as scavengers avoids the substances found in carriions to become a breeding ground for disease.