


CAPOVACCAIO PILEATO

Necrosyrtes monachus



PESO	♂ 1.8 Kg ♀ 2.5 Kg
APERTURA ALARE	155 - 165 cm
HABITAT	Vive in aree abitate, nelle zone coltivate e ai margini delle foreste.
ALIMENTAZIONE	Si nutre principalmente di carcasse, ma anche di locuste, termiti e altri insetti.
ABITUDINI	Generalmente sedentario, in Africa meridionale viene avvistato da solo, in coppia o in piccoli gruppi. In Botswana si associa spesso ai branchi di licaoni, mentre in Uganda viene frequentemente osservato in compagnia dei marabù.
RIPRODUZIONE	Costruisce il nido su un albero, preferibilmente un baobab. La femmina depone un solo uovo. Entrambi i genitori, ma soprattutto la femmina, lo covano per circa sei settimane e mezza.
PARTICOLARITÀ	Il capovaccaio pileato è l'avvoltoio africano con il legame più stretto con l'uomo. Spesso lo si osserva nei campi coltivati, tra i contadini, mentre si nutre degli insetti smossi dal lavoro agricolo. Inoltre, poiché il suo becco non è abbastanza robusto, segue i grandi carnivori durante la caccia, aspettando che aprano la carcassa della preda per potersi nutrire dei resti.
DISTRIBUZIONE	È diffuso in gran parte dell'Africa subsahariana, dal Senegal e dalla Mauritania meridionale fino al Sudan, all'Etiopia e alla Somalia occidentale. La sua presenza si estende verso sud fino al nord della Namibia e del Botswana, passando per lo Zimbabwe, fino al Mozambico meridionale e al nord-est del Sudafrica.

KAPPENGEIER

GEWICHT	♂ 1.8 Kg ♀ 2.5 Kg
SPANNWEITE	155 - 165 cm
LEBENSRAUM	Er lebt in bewohnten Gebieten, auf landwirtschaftlichen Flächen und an Waldrändern.
ERNÄHRUNG	Er ernährt sich hauptsächlich von Aas, aber auch von Heuschrecken, Termiten und anderen Insekten.
LEBENSWEISE	Er ist meist standorttreu. Im südlichen Afrika wird er oft allein, paarweise oder in kleinen Gruppen gesichtet. In Botswana schließt er sich häufig Wildhund Rudeln an, während er in Uganda oft in Gesellschaft von Marabus beobachtet wird.
BRUTPERIODE	Er baut sein Nest auf einem Baum, vorzugsweise einem Baobab. Das Weibchen legt ein einziges Ei. Beide Elternteile, vor allem das Weibchen, brüten es etwa sechseinhalb Wochen lang aus.
BESONDERHEITEN	Der Kappengeier ist der afrikanische Geier mit der engsten Verbindung zum Menschen. Oft ist er auf Feldern zwischen Bauern zu sehen, wo er die durch landwirtschaftliche Arbeit freigelegten Insekten frisst.

VERBREITUNG Er ist in weiten Teilen des subsaharischen Afrikas verbreitet, vom Senegal und dem südlichen Mauretanien über den Süden Nigers und den Tschad bis in Sudan, Äthiopien und das westliche Somalia. Seine Verbreitung erstreckt sich weiter nach Süden bis in den Norden Namibias und Botswanas und reicht über Simbabwe bis in den Süden Mosambiks und den Nordosten Südafrikas.

HOODED VULTURE

WEIGHT	♂ 1.8 Kg ♀ 2.5 Kg
WINGSPAN	155 - 165 cm
HABITAT	This species can be found at the edges of forests, cultivated lands and even in urban habitats - often living quite close to humans.
DIET	It mainly feeds on carcasses but also on locusts, termites, and other insects.
LIVING HABITS	Generally sedentary, in southern Africa, it is spotted alone, in pairs or in small groups. In Botswana, it often associates with packs of African wild dogs, while in Uganda, it is frequently observed in the company of marabous.
REPRODUCTION	The Hooded Vulture builds a large stick nest in tall trees but preferably baobab. The female lays a single egg. Both parents, but especially the female, incubate it for about six and a half weeks.
PARTICULARITIES	The hooded vulture is the African vulture most closely associated with humans. It is often seen in cultivated fields among farmers, feeding on insects stirred up by agricultural work. Additionally, since its beak is not strong enough, it follows large carnivores during hunts, waiting for them to open the carcass of the prey so it can feed on the remains.
DISTRIBUTION	It is widely distributed across much of sub-Saharan Africa, from Senegal and southern Mauritania to Sudan, Ethiopia, and western Somalia. Its range extends southward to northern Namibia and Botswana, through Zimbabwe, reaching southern Mozambique and northeastern South Africa.