


URUBÙ

Coragyps atratus



PESO:	ca. 1.2 - 1.9 Kg
APERTURA ALARE:	130 - 150 cm
ZONA DI DIFFUSIONE:	Negli Stati Uniti meridionali e orientali e nella maggior parte dell'America meridionale.
HABITAT:	Nelle pianure con altopiani, campi aperti, terreno desertico, discariche e centri urbani o rurali.
ABITUDINI:	Quando le loro zone coincidono va spesso in cerca di cibo con l'avvoltoio dal collo rosso, ma in genere riesce ad allontanare questi uccelli più grandi quando ci si contende il cibo.
ALIMENTAZIONE:	Sono spesso osservati a frugare tra i rifiuti nelle discariche e nelle zone di pesca.
PERIODO DI NIDIFICAZIONE:	La femmina depone 2 uova e cova, tra aprile e giugno, dai 38 ai 45 giorni.
PARTICOLARITÀ:	Il loro olfatto è molto sviluppato.

RABENGEIER

GEWICHT:	ca. 1.2 - 1.9 Kg
SPANNWEITE:	130 - 150 cm
VERBREITUNG:	In den Süd- und Oststaaten der USA sowie in fast allen Ländern Südamerikas.
LEBENSRAUM:	Hochebenen, offene Felder, Wüstenlandschaften, Müllhalden, Städte und Dörfer.
LEBENSWEISE:	Wenn ihre Gebiete übereinstimmen, sucht er oft Nahrung mit dem Truthahngerier, aber normalerweise gelingt es ihm, diesen grösseren Vogel zu vertreiben, wenn sie sich um die Nahrung streiten.
ERNÄHRUNG:	Aas, Kleintiere und Abfälle. Oft werden sie beobachtet, wenn sie in den Müllhalden und in Fischereizonen stöbern.
BRUTPERIODE:	Die Brutzeit liegt zwischen April und Juni. Das Weibchen legt 2 Eier, die in 38-45 Tagen ausgebrütet werden.
BESONDERHEITEN:	Ihr Geruchssinn ist sehr gut entwickelt.

VAUTOUR URUBU

POIDS:	ca. 1.2 - 1.9 Kg
ENVERGURE MOYENNE:	130 - 150 cm
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE:	Etats-Unis méridionaux et orientaux et dans la majeure partie de l'Afrique méridionale.
HABITAT:	Dans les plaines avec hauts-plateaux, champs ouverts, terrains désertiques, dépôts d'ordures et zones urbaines et agricoles.
COMPORTEMENT:	Quand leur zone de chasse coïncide, le vautour urubu chasse souvent en compagnie du vautour à col rouge, mais en cas de litige pour la nourriture il réussit généralement à éloigner les oiseaux plus grands.
ALIMENTATION:	Fouillent dans les débris des décharges et des zones de pêche.
REPRODUCTION:	La femelle pond 2 œufs et les deux parents les couvent pendant 38 à 45 jours.
PARTICULARITÉ:	Leur odorat est très développé.

BLACK VULTURE

WEIGHT:	ca. 1.2 - 1.9 Kg
WINGSPAN:	130 - 150 cm
DIFFUSION:	Southern and eastern USA as well as most of South America.
HABITAT:	Plains with plateaus, open fields, deserted areas, landfills and rural and urban centres.
HABITS:	When on the same sheet of land food search is operated in collaboration with the Turkey Vulture but he usually does overpower these bigger birds when contending the food.
DIET:	Often found rummaging through the garbage in the landfills and fishing areas.
REPRODUCTION:	The female lays two eggs and incubates them, between April and June, for 38 to 45 days.
PARTICULARITIES:	Their sense of smell is very developed.