


AQUILA BLU CILENA

geranoaetus melanoleucus



PESO

♂ 1.7 - 2.6 kg

♀ 2.3 - 3 Kg

APERTURA ALARE

150 - 200 cm

HABITAT

Il suo habitat naturale è costituito dai grandi terreni aperti, preferibilmente con rilievi rocciosi montani o collinari; raramente la specie è stata avvistata in territori pianeggianti. Ama le zone con bassa vegetazione, dove è in grado di cacciare le sue prede con maggiore facilità.

ALIMENTAZIONE

Principalmente mammiferi. Il coniglio europeo, il degu e la moffetta dal naso di porco costituiscono prede importanti. Occasionalmente civette delle tane e altri uccelli più grandi come il guan e il tinamo del Cile; il rapace si nutre anche di grandi squamati.

RIPRODUZIONE

Il periodo riproduttivo si estende durante tutto l'anno in Ecuador, ma si riduce nelle altre zone dell'areale: in Cile le osservazioni riportano la sua durata da agosto a settembre, in Colombia da aprile a luglio, e in Perù i pulcini sono stati osservati a maggio.

ABITUDINI

Il corteggiamento avviene attraverso lunghi voli, durante i quali il maschio si dispone parallelamente, e a volte vola al di sopra della femmina. La nidificazione avviene principalmente sui picchi rocciosi; qualora questi non fossero disponibili può avvenire anche su alberi alti o su cactus. Il nido è composto da steli secchi e privati di foglie di specie erbacee o arbustive; di norma non riutilizza il nido usato nella precedente stagione ma preferisce costruirne uno nuovo, anche a poca distanza da quello vecchio.

DISTRIBUZIONE

America del Sud.

BLAUBUSSARD

♂ 1.7 - 2.6 kg

♀ 2.3 - 3 Kg

GEWICHT

SPANNWEITE

150 - 200 cm

LEBENSRAUM

Der Aguja besiedelt lichte Trockenwälder, mit Scheinbuchen bestandene Baumsavannen, Übergangshabitate zwischen Trockenwald und Pampa („Espinal“), Savannen und Weideland sowie teils halbwüstenartiges Buschland. Besonders häufig ist er in felsigen Berglandschaften mit Schluchten und angrenzendem Grasland zu finden.

ERNÄHRUNG

Der Aguja ernährt sich von kleineren Säugetieren, Vögeln und deren Nestlingen, Schlangen und Eidechsen, Aas, Insekten oder anderen Wirbellosen. Säugetiere machen mindestens 80 % der Beute aus. Dazu zählen hauptsächlich Strauchratten, Meerschweinchen, Skunks und Viscachas sowie die in Teilen Südamerikas eingeführten Feldhasen und Wildkaninchen. Das Gewicht der Beutetiere reicht bis zu 2 oder 3 kg.

LEBENSWEISE

Der Aguja jagt hauptsächlich aus dem Flug heraus – entweder kreisend oder in längeren Segelflügen, im Wind hängend oder gelegentlich auch rüttelnd – und geht im Sturzflug auf die Beute nieder. Eher selten ist er auch bei der Ansitzjagd zu beobachten. Oft ist die Art dann paarweise jagend zu sehen und nutzt die Thermiken an nördlich und westlich ausgerichteten Bergrücken aus.

BRUTPERIODE

Die Brutzeit des Agujas liegt in Venezuela zwischen Februar und August, in Ecuador zwischen September und April. Da im südlichen Kolumbien jedoch zwischen April und Mitte Juli ausfliegende Vögel festgestellt wurden, brütet die Art am Äquator möglicherweise das ganze Jahr über. In Peru brütet sie zwischen Mai und Oktober, im mittleren Argentinien und Chile jedoch zwischen September und Januar sowie weiter südlich zwischen Oktober und Februar und somit während der dortigen Sommermonate.

VERBREITUNG

Der Aguja ist in den klimatisch eher gemäßigten Regionen der Neotropis beheimatet, Südamerika.

CHILEAN BLUE EAGLE

♂ 1.7 - 2.6 kg

♀ 2.3 - 3 Kg

WEIGHT

WINGSPAN

150 - 200 cm

HABITAT

The black-chested buzzard-eagle is found in mountainous or hilly terrain with sparse vegetation, shrubland or (in the south of its range) Nothofagus forest, where it spends a lot of time soaring in thermals and vertical drafts while looking for prey.

ALIMENTATION

The food of this carnivore consists mainly of mid-sized mammals; the introduced European rabbit seems to have become a key prey item. The black-chested buzzard-eagle is helpful to farmers by keeping down the numbers of the rabbits, which can be serious agricultural pests. Among the native fauna degus and hog-nosed skunks are important prey, but mammals as formidable as a gray fox – two to over three times as heavy as the birds and certainly not defenceless – are occasionally hunted and killed by this hawk.

HABITS

It is most conspicuous in the mid-morning and afternoon, when individuals will seek out places which provide the best soaring conditions, such as north and west facing slopes and ridges. Apparently, their main interest at these times is aerial play and display; they tend to ignore places where food is more plentiful or easily hunted in favor of simply soaring alone or in pairs in strong air currents.

NESTING PERIOD

It nests in high trees or on rocky cliffs, or if these are not available on high trees or even cacti. If no appropriate high place is available this species will nest in bushes or even on the ground. In Ecuador, nesting can be observed all year round; elsewhere it might have a more restricted breeding season.

DISTRIBUTION

It lives in open regions of South America.