

BARBAGIANNI

tyto alba



PESO ♂ 250 - 450 g ♀ 300 - 550 g

APERTURA ALARE 80 - 100 cm

HABITAT Praterie, campagne coltivate, paludi, spazi aperti ai margini di boschi e abitazioni rurali, evita zone montuose elevate o troppo aride.

ALIMENTAZIONE Preda quasi esclusivamente piccoli roditori terrestri come arvicole, topi, ratti e toporagni che caccia con bassi voli di ricerca su campi aperti. Spesso restando in sospensione cattura anche piccoli uccelli, pipistrelli e rane.

ABITUDINI Sedentari e notturni, i barbagianni cacciano anche con la luce (prima del tramonto e dopo l'alba) specialmente in estate quando hanno piccoli, sempre affamati, oppure gli individui giovani inesperti, in inverno, per trovare abbastanza prede per sopravvivere.

RIPRODUZIONE A seconda dell'areale distributivo: in Europa, tra Febbraio e Giugno, la femmina depone in media 4-7 uova (può arrivare fino a 14 uova in annate favorevoli) in nidi abbandonati da altri uccelli, cavità di alberi, anfratti rocciosi ma soprattutto in ruderi ed edifici umani. L'incubazione dura 30-35 giorni.

PARTICOLARITÀ Il Barbagianni ha il disco facciale a forma di cuore che gli fornisce un udito sensibilissimo. Il suo verso è una specie di grido rauco ed acuto: unito alle sue abitudini notturne, al colore bianco candido, all'abitare spesso in edifici umani abbandonati...È forse il Barbagianni l'origine della leggenda dei fantasmi?

DISTRIBUZIONE È diffuso in tutta Europa e Russia occidentale, Africa, Medio Oriente, Subcontinente Indiano, sud-est asiatico, anche in alcuni gruppi di isole (Canarie, Madagascar, Comore, Seychelles) con 10 sottospecie principali.

SCHLEIEREULE

♂ 250 - 450 g ♀ 300 - 550 g

GEWICHT

SPANNWEITE

80 - 100 cm

LEBENSRAUM

Halboffene Landschaften wie Savannen, Halbwüsten und Baumsteppen werden bevorzugt. In Mitteleuropa besiedelt sie als Kulturfolger fast ausschließlich die offene Agrarlandschaft mit dörflichen Siedlungen.

ERNÄHRUNG

Die Beute besteht vor allem aus Wühlmäusen, Echten Mäusen und Spitzmäusen. Die Ortung der Beute erfolgt optisch und akustisch. Der Gesichtsschleier verstärkt die Schallsammlung für das Gehör und schirmt andere Geräusche ab.

LEBENSWEISE

Die Schleiereule jagd vor allem in der Dämmerung und nachts. Bei ungünstigen Wetterbedingungen sowie während der Jungenaufzucht dehnt sie ihre Jagdzeit auch auf den Tag aus.

BRUTPERIODE

Die drei bis zwölf im Abstand von etwa zwei Tagen gelegten Eier werden etwa 30 Tage lang vom Weibchen bebrütet. Das Weibchen brütet und hudert allein, bis zum Alter des Jüngsten von ca. drei Wochen bringt allein das Männchen die Nahrung herbei.

BESONDERHEITEN

Als Jäger von Mäusen und Ratten wird die Schleiereule vielerorts in Mitteleuropa von Landwirten geschätzt. Traditionell gebaute Scheunen und Ställe haben deshalb in vielen Regionen sogenannte Eulentüren oder Eulenlöcher (Uhlenloch oder Uhlenflucht), die den Vögeln Zugang zu geeigneten Brutplätzen bieten.

VERBREITUNG

Die Schleiereule besiedelt die gemäßigten, subtropischen und tropischen Zonen von Afrika, Europa, Südwest und Südasien, Australien, Südamerika und Nordamerika. Sie zählt damit zu den am weitesten verbreiteten Vogelarten überhaupt.

BARNOWL

♂ 250 - 450 g ♀ 300 - 550 g

WEIGHT

WINGSPAN

80 - 100 cm

HABITAT

Grasslands, cultivated countries, wetlands, open spaces on the edge of woods and country habitations. They avoid too high mountainous areas and too dry regions.

ALIMENTATION

Feed almost exclusively on ground small Rodents, Voles mainly but also Rats, Mice and Shrews, which hunts by a low searching flight over open fields, often hovering. Small birds, bats and frogs are also taken.

HABITS

Sedentary and nocturnal, Barn owls hunt in light too (before dusk and after dawn) especially in summer when they have always hungry owlets or young inexperienced individuals in winter, struggling to find enough prey to survive.

NESTING PERIOD Depending on the living zone : in Europe between February and June female lay 4-7 eggs (14 in good seasons) in other birds' abandoned nests, tree hollows, rocky crannies but especially in ruins and human buildings. Incubation lasts 30-35 days. Barn owls are monogamous; male hunts and bring preys to the nest during incubation and for one month more after the hatching but is female's duty to feed the owlets with small chunks.

PARTICULARITIES Barn owl has an heart-shaped facial disk which gives him an exceptionally sensitive hearing. His voice is an high-pitched harsh shriek : combined with his nocturnal habits, his candid white color and his frequent living in human abandoned buildings , could be the Barn owl the origin of the legend of the ghosts...?

DISTRIBUTION

Widespread in all Europe and western Russia, Africa, Middle east, Indian subcontinent, Southeast Asia and in some islands groups (Canaries, Comore, Madagascar, Seychelles) with 10 principal subspecies.