

AQUILA DI MARE TESTABIANCA

Haliaeetus leucocephalus



PESO:	♂ 3.0 - 4.5 kg ♀ 4.5 - 6.0 kg
APERTURA ALARE:	180 - 230 cm
ZONA DI DIFFUSIONE:	Canada e Alaska. Si sposta a sud fino alla Florida.
HABITAT: ABITUDINI:	Stanziano lungo le zone costiere, laghi alpini e fiumi. Costruisce enormi nidi di rami sulle cime degli alberi o su spuntoni di roccia. Vive in grandi colonie lungo i fiumi dove i salmoni depongono le uova.
ALIMENTAZIONE:	Si ciba preferibilmente di salmone, vivo o morto e, in misura minore, anche di mammiferi, invertebrati e rettili.
PERIODO DI NIDIFICAZIONE:	Fine marzo inizio aprile. Depongono 1-3 uova che si schiudono dopo 35 giorni.
PARTICOLARITÀ:	I giovani dell' aquila americana hanno un piumaggio scuro con una pancia bruna e segni chiari sulle ali e sulla coda. In volo l'uccello adulto appare uniformemente marrone, con testa e coda bianche.

WEISSKOPF-SEEADLER

GEWICHT:	♂ 3.0 - 4.5 kg ♀ 4.5 - 6.0 kg
SPANNWEITE:	180 - 230 cm
VERBREITUNG:	Kanada und Alaska. Sie fliegen auch südwärts bis nach Florida.
LEBENSRAUM:	Sie leben in Küstengebieten, an Bergseen und Flüssen.
LEBENSWEISE:	Sie bauen riesige Nester aus Zweigen auf hohen Bäumen oder Felsvorsprüngen. Sie leben in grossen Kolonien an Flüssen, wo Lachse ihre Eier ablegen.
ERNÄHRUNG:	Sie ernähren sich vorzugsweise von Lachs, lebendig oder tot, auch von Säugetieren, Wirbellosen und Reptilien.
BRUTPERIODE:	Ende März - Anfang April. Das Weibchen legt 1-3 Eier. Die Jungtiere schlüpfen nach 35 Tagen.
BESONDERHEITEN:	Die Jungtiere des amerikanischen Adlers haben dunkles Gefieder, einen braunen Bauch und helle Zeichen auf den Flügeln und dem Schwanz. Im Flug erscheint der erwachsene Vogel einheitlich braun mit weissem Kopf und Schwanz.

PYGARGUE À TÊTE BLANCHE OU AIGLE DE MER

POIDS:	♂ 3,0 - 4.5 kg ♀ 4.5 - 6.0 kg
ENVERGURE MOYENNE:	180 - 230 cm
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE:	Canada et Alaska. Se déplace vers le sud jusqu'en Floride.
HABITAT:	S'établit le long des côtes, des lacs alpins et des fleuves.
COMPORTEMENT:	Construit d'énormes nids de branches au sommet des arbres ou sur des pics de rochers. Vit en grandes colonies le long des fleuves où les saumons pondent leurs œufs.
ALIMENTATION:	Se nourrit de préférence de saumons morts ou vifs et plus rarement de mammifères, invertébrés et reptiles.
REPRODUCTION:	Fin mars début avril. La femelle pond 1 à 3 œufs qui éclosent après 35 jours.
PARTICULARITÉ:	Les jeunes aigles américains ont un plumage sombre, un ventre brun et des marques blanches sur les ailes et la queue. L'oiseau adulte apparaît uniformément marron avec tête et pattes blanches.

BALD EAGLE

WEIGHT:	♂ 3,0 - 4.5 kg ♀ 4.5 - 6.0 kg
WINGSPAN:	180 - 230 cm
DIFFUSION:	Canada and Alaska, moving south until Florida.
HABITAT:	They rest along the coastlines, mountain lakes and rivers.
HABITS:	The Bald Eagles build extremely big nests on tree tops or rocks. They live in big colonies along rivers where salmon upstream to lay their eggs.
DIET:	They usually feed on salmon (dead or alive) and - secondary - on mammals, invertebrates and reptiles.
REPRODUCTION:	They mate usually around the end of March and the beginning of April. One to three eggs are laid and they hatch after 35 days.
PARTICULARITIES:	Young Bald Eagles have a dark plumage with a brown breast and light markings on the wings and tail. Whilst flying, the eagle appears to be evenly brown, with just the white head and tail.