

CARACARA CRESTATA

Polyborus plancus



PESO: ♂ 1.0 - 1.5 kg ♀ 1.2 - 2.0 kg

APERTURA ALARE: 130 - 160 cm

ZONA DI DIFFUSIONE: America centrale e del sud, è anche presente in Texas nella Florida centrale e nell'Arizona meridionale, Panama dell'ovest e Cuba.

HABITAT: Predilige i cespuglietti non troppo fitti. La si trova nelle praterie, ai bordi dei fiumi, nella savana e nelle pampas.

ABITUDINI: Nidifica sugli alberi e caccia al suolo, girando con le sue lunghe zampe le foglie e i sassi alla ricerca di cibo.

ALIMENTAZIONE: Cattura piccoli mammiferi, uccelli, pesci, anfibi, rettili e invertebrati come le lucertole e i serpenti ma ruba anche cibo ad altri rapaci, quali gli avvoltoio nero e dal collo rosso. A volte si nutre anche di carogne recenti.

RIPRODUZIONE: La stagione di nidificazione va da gennaio a marzo. La femmina depone solitamente 2-3 uova che vengono covate per 28 - 32 giorni.

PARTICOLARITÀ: La femmina e il maschio si danno il cambio per covare.

SCHOPFKARAKARA

GEWICHT: ♂ 1.0 - 1.5 kg ♀ 1.2 - 2.0 kg

SPANNWEITE: 130 - 160 cm

VERBREITUNG: Mittel- und Südamerika. Er ist auch in Texas, im Herzen Floridas, im südlichen Arizona, in West-Panama und in Kuba zu finden.

LEBENSRAUM: Er zieht nicht zu dichte, kleine Gebüsch vor. Man findet ihn in Wiesenlandschaften, an Flussufern, in der Savanne und den Pampas.

LEBENSWEISE: Er nistet auf Bäumen. Mit seinen langen Krallen scharrt er auf dem Boden unter Blättern und Steinen nach Nahrung.

ERNÄHRUNG: Kleine Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, Eidechsen und Schlangen. Er stiehlt auch Nahrung von anderen Raubtieren, wie dem Rotkehlgeier und dem Rabengeier. Manchmal ernährt er sich auch von frischem Aas.

BRUTPERIODE: Die Brutzeit geht von Januar bis März. Das Weibchen legt 2-3 Eier, die in 28-32 Tagen ausgebrütet werden.

BESONDERHEITEN: Weibchen und Männchen wechseln sich beim Brüten ab.

CARACARA HUPPÉ

POIDS: ♂ 1.0 - 1.5 kg ♀ 1.2 - 2.0 kg

ENVERGURE MOYENNE: 130 - 160 cm

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE: Amérique du sud et centrale, ainsi qu'au Texas, en Floride centrale, Arizona méridionale, l'ouest du Panama et Cuba.

HABITAT: Vit volontiers dans les buissons pas trop épais, les prairies, aux bords des fleuves, dans la savane et la pampa.

COMPOTEMENT: Nidifie dans les arbres et chasse au sol retournant les feuilles et les pierres de ses longues pattes pour trouver la nourriture.

ALIMENTATION: Capture des petits mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens, reptiles et invertébrés tels que lézards et les serpents. Mais il dérobe aussi la nourriture à d'autres rapaces, tels que vautours noirs au col rouge. Quelquefois il se nourrit aussi de charognes fraîches.

REPRODUCTION: La saison de nidification est de janvier à mars. La femelle pond généralement 2 à 3 œufs couvés pendant 28 à 32 jours.

PARTICULARITÉ: La femelle et le mâle couvent à tour de rôle.

CRESTED CARACARA

WEIGHT: ♂ 1.0 - 1.5 kg ♀ 1.2 - 2.0 kg

WINGSPAN: 130 - 160 cm

DISTRIBUTION: Originally from Central and South America, the Caracara is also found in Texas and central Florida, as well as in southern Arizona, west Panama and Cuba.

HABITAT: The Caracara prefers bushes which are not too thick. You can find this bird in the prairies, along the riversides, in the savannah as well as in the pampas.

LIVING HABITS: It nests on trees and hunts on the ground, using its long legs to turn any leaf or stone that could hide some food.

DIET: Hunting small mammals, birds, fish, amphibians, reptiles and invertebrates such as lizards and snakes, the Caracara also steals food from other birds of prey - such as the Black and the Turkey Vulture - and does sometimes feed on recent carcasses.

REPRODUCTION: Nesting period goes from January to March. The female lays only two or three eggs which are incubated for 28 - 32 days.

PARTICULARITIES: Both female and male incubate, taking it in turns.